

## Cervixcancer, stadietinddeling FIGO 2018 og UICC Cervix uteri TNM 2021

FIGO stadium	Klinik	T	N	M
IA1	Invasionsdybde ≤ 3 mm	T1a1 (AZCD13a1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IA2	Invasionsdybde > 3 mm og ≤ 5 mm	T1a2 (AZCD13a2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB1	Invasionsdybde > 5 mm og tumorstørrelse ≤ 2 cm	T1b1 (AZCD13b1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB2	Tumorstørrelse >2 cm og ≤ 4 cm	T1b2 (AZCD13b2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB3	Tumorstørrelse > 4 cm	T1b3 (AZCD13b3)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIA1	Nedvækst øverste 2/3 af vagina, parametrier fri, tumorstørrelse ≤ 4 cm	T2a1 (AZCD14a1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIA2	Nedvækst øverste 2/3 af vagina, parametrier fri, tumorstørrelse > 4 cm	T2a2 (AZCD14a2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIB	Invasion i parametrie(r), tumor når ikke bækkenvægge(n)	T2b (AZCD14b)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIA	Nedvækst øverste 1/3 af vagina, tumor når ikke bækkenvægge(n)	T3a (AZCD15a)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIB	Udvækst til bækkenvægge(n) og/eller hydronefrose eller udslukt nyre	T3b (AZCD15b)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIC1	Metastase til pelvine lymfeknuder uanset tumorstørrelse og -udbredning (radiologisk/patologisk verificeret)	Vælg en af ovenstående T-koder	N1 (AZCD31)	M0 (AZCD40)
IIIC2	Metastase til paraaortale lymfeknuder uanset tumorstørrelse og -udbredning (radiologisk/patologisk verificeret)	Vælg en af ovenstående T-koder	N2 (AZCD32)	M0 (AZCD40)
IVA	Spredning til blære eller rectum (biopsiverificeret fra mukosa i blære/tarm), eller spredning til øvre abdomen	T4 (AZCD16)	Vælg en af ovenstående N-koder	M0 (AZCD40)
IVB	Fjernmetastaser inkl. inguinale lymfeknuder og intraperitoneal spredning. Ekskl. metastaser til vagina og bækkenvæg, men inkl. uterus serosa og adnexae*	Vælg en af ovenstående T-koder	Vælg en af ovenstående N-koder	M1 (AZCD41)

\* FIGO ekskluderer uterus serosa og adnex involvering fra M1. UICC/TNM 2021 og AJCC inkluderer uterus serosa og adnex involvering i M1.

Arbejdsgruppen anbefaler at følge UICC/TNM og AJCC. (Marts 2026)