

LPR3-kodning af Livmoderhalskræft gældende fra 15. august 2025

Anmeldelsespligtige diagnoser

Canceranmeldelse til Cancerregistret via LPR omhandler *den enkelte sygdom*.

Udviklingen i sygdommen kan repræsenteres af forskellige diagnosekoder på forskellige tidspunkter i forløbet, men der er stadig tale om *den samme* anmeldelsespligtige sygdom. Dette inkluderer lokal eller dissemineret recidiv, metastasering og anden form for progression af sygdommen.

PRIMÆR SYGDOM

Når mikroskopisvar foreligger

eller

Ved henvisning til kurativt intenderet/pallierende onkologisk behandling

eller

Ved henvisning til rent palliativ behandling uden operation og kemoterapi

Kodevejledningen ved primær sygdom er opbygget over obligate koder for

1) **A-diagnose** (*primær tumor*)

2) **Tillægskoder**

a. Metastasestatus, (*m-kode*). Der skal angives minimum 1 kode

b. Sideangivelse

3) **Canceranmeldelse** (*anmeldelsesstatus, makroskopisk og mikroskopisk diagnosegrundlag samt TNM*)

4) **B-diagnose**

a. Yderligere relevante b-diagnoser for komorbiditet

1) **A-diagnose** (*primær tumor*)

Livmoderhalskræft	DC539
-------------------	-------

2) **Tillægskode**

Metastasestatus (der skal angives minimum 1 kode)

Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A
Fjernmetastase uspecificeret	DC798D

3) **Canceranmeldelse** (*anmeldelsesstatus, makroskopisk og mikroskopisk diagnosegrundlag samt TNM*)

Anmeldelsesstatus

Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen	AZCA1
--	-------

Klinisk makroskopisk diagnosegrundlag

Operation (inkl. biopsi)	AZCK0
Billeddiagnostisk undersøgelse	AZCK2

Klinisk undersøgelse	AZCK4
----------------------	-------

Klinisk mikroskopisk diagnosegrundlag

Histologi/cytologi fra primær tumor	AZCL0
Histologi fra metastase	AZCL1
Histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor eller metastase	AZCL2
Ingen histologisk/cytologisk/klinisk-mikroskopisk undersøgelse	AZCL9

Cervixcancer

FIGO stadie	Klinik	T	N	M
IA1	Invasionsdybde $\leq$ 3mm	T1a1 (AZCD13a1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IA2	Invasionsdybde >3 mm og $\leq$ 5mm	T1a2 (AZCD13a2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB1	Tumorstørrelse $\leq$ 2 cm	T1b1 (AZCD13b1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB2	Tumorstørrelse >2 cm og $\leq$ 4 cm	T1b2 (AZCD13b2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IB3	Tumorstørrelse >4 cm	T1b3 (AZCD13b3)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIA1	Nedvækst øverste 2/3 af vagina, parametrier fri, tumorstørrelse $\leq$ 4 cm	T2a1 (AZCD14A1)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIA2	Nedvækst øverste 2/3 af vagina, parametrier fri, tumorstørrelse >4 cm	T2a2 (AZCD14A2)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIB	Invasion i parametrie(r), tumor når ikke bækkenvægge(n)	T2b (AZCD14b)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIA	Nedvækst øverste 1/3 af vagina, tumor når ikke bækkenvægge(n)	T3a (AZCD15a)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIB	Udvækst til bækkenvægge(n) og/eller hydronefroze eller udslukt nyre	T3b (AZCD15b)	N0 (AZCD30)	M0 (AZCD40)
IIIC1	Metastase til pelvine lymfeknuder uanset tumorstørrelse og -udbredning (radiologisk verificeret)	Vælg den af de ovenstående t-koder, der svarer til tumorudbredelse	N1* (AZCD31)	M0 (AZCD40)
IIIC2	Metastase til paraaortale lymfeknuder uanset tumorstørrelse og -udbredning (radiologisk verificeret)	Vælg den af de ovenstående t-koder, der svarer til tumorudbredelse	N2* (AZCD32)	M0 (AZCD40)
IVA	Spredning til tilstødende organer i bækkenet (biopsiverificeret fra mukosa i blære/tarm)	T4 (AZCD16)	Vælg den af de ovenstående N-koder, der svarer til lymfeknudestatus	M0 (AZCD40)
IVB	Fjernmetastaser	Vælg den af de ovenstående t-koder, der svarer til tumorudbredelse	Vælg den af de ovenstående N-koder, der svarer til lymfeknudestatus	M1 (AZCD41)

*For cervix findes kun N0 og N1 i TNM og WHO-regi. DGCD-styregruppen har aftalt, at pelvine lymfeknudemetastaser kodes N1 og paraaortale lymfeknudemetastaser kodes N2 af hensyn til af kunne skelne FIGO IIIC1 og IIIC2 i DGCD.

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

OPFØLGNING

Kodevejledningen er opbygget over obligate koder for

- 1) **A-diagnose** (eks. Kontrol efter operation af kræft i livmoderhals)
- 2) **Tillægskoder**
 - a. Recidivstatus. Der skal angives minimum 1 kode
- 3) **B-diagnose**
 - a. Yderligere relevant B diagnoser for komorbiditet

1) A-diagnose

Kontrolundersøgelse efter operation af kræft i livmoderhals	DZ080M
Kontrolundersøgelse efter strålebehandling af kræft i livmoderhals	DZ081M
Kontrolundersøgelse efter kemoterapi af kræft i livmoderhals	DZ082K
Kontrolundersøgelse efter kombineret behandling af kræft i livmoderhals	DZ087M

2) Tillægskode (recidiv status) Der skal angives minimum 1 kode

Intet recidiv (normalt undersøgelsesresultat)	ZPR01N
Recidiv	ZDW51F

3) B-diagnose (Husk yderligere relevante B diagnoser for komorbiditet)

Eksempel

A-diagnose: kontrolundersøgelse efter operation af livmoderhals

DZ080M

Tillægskode: Intet recidiv

ZPR01N

B-diagnose: Hypertension

DI109

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

RECIDIVFORLØB (henvist med recidiv eller ved mistanke om recidiv)

Som A *diagnose* skal obs diagnose eller recidiv lokalisation angives.

Som B-*diagnose* skal primær cancer registreres sammen med AZCA2/AZCA4 tillægskode.

Kodevejledning:

- 1) **A-diagnose:** Lokalisation af recidiv (f.eks. lokalrecidiv uspec, DC991) (lokalt, regionalt eller fjernrecidiv) det mest omfattende
- 2) **B-diagnose: primær cancer** (livmoderhalskræft)
- 3) **Tillægskode** (til B-diagnose)
 - a. **Metastase status**
 - b. **Yderligere comorbiditet**
- 4) **Canceranmeldelse: klinisk recidiv** AZCA2 (tillægskode til b-diagnosen primær cancer ved recidiv)

Ved mistanke om recidiv diagnose – obs diagnosen er A-*diagnose*

1) A-diagnose

Obs. pga. mistanke om recidiv af kræft i livmoderhals	DZ031K3R
---	----------

Eksempel

A-diagnose: Obs. pga. mistanke om recidiv af kræft i livmoderhals

DZ031K3R

B-diagnose: Komorbiditet eks hypertension

DI109

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Ved verificeret recidiv

Der er tre scenarier med verificeret recidiv

- **Verificeret isoleret lokalrecidiv** (vaginaltop)
- **Verificeret regionalrecidiv med/uden lokalrecidiv uden fjernmetastaser** (recidiv i lymfeknuder fra bækkenet og til aorta bifurkaturen)
- **Dissemineret recidiv/fjernrecidiv med uden lokalt/regionalt recidiv** (recidiv i lymfeknuder over aorta bifurkaturen, carcinose, fjernmetastaser)

Isoleret lokalrecidiv (uden regionalt recidiv eller fjernmetastaser)

A-diagnose relaterer til lokalisation af recidivet og ikke til primær cancer.

1) A-diagnose

Lokalrecidiv UNS	DC991
------------------	-------

2) B-diagnose - Primærcancer (med tilhørende tillægskoder)

Kræft i livmoderhalsen	DC539
------------------------	-------

3) Tillægskode (til B-diagnose)

Metastase status

Recidiv	ZDW51F
---------	--------

Ingen lymfeknudemetastaser påvist	DZ062A
Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel:

A-diagnose: Lokalrecidiv uspecificeret

DC991

B-diagnose: livmoderhalskræft

DC539

>Recidiv

ZDW51F

>Ingen Lymfeknudemetastaser påvist

DZ062A

>Ingen fjernmetastaser påvist

DZ061A

Canceranmeldelse: Klinisk recidiv.

AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Regionalt recidiv – (pt har regionalt recidiv +/-lokaliseret recidiv)

A-diagnose relaterer til lokalisation af recidivet og ikke til primær cancer.

1) A-diagnose

Regional intrapelvin lymfeknudemetastase	DC775A1
--	---------

2) B-diagnose primær cancer (med tilhørende tillægskoder)

Livmoderhalskræft	DC539
-------------------	-------

3) Tillægskode til B diagnose

Metastase status

Recidiv	ZDW51F
Intet lokalrecidiv påvist	DZ063A
Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel (isoleret regionalt recidiv)

Indtil videre da koden ikke er godkendt må i stedet bruges følgende som A-diagnose, da det oftest er i recidiv i regional lymfeknude

A-diagnose: Regional intrapelvin lymfeknudemetastase

DC775A1

B-diagnose: Livmoderhalskræft

DC539

Tillægskoder

> recidiv

ZDW51F

> Ingen fjernmetastaser påvist

DZ061A

> Intet lokalt recidiv påvist

DZ062A

Canceranmeldelse: Klinisk recidiv

AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Fjernrecidiv

A-diagnose relaterer til lokalisation af recidivet og ikke til primær cancer.

1) A-diagnose

Fjernmetastase uspecificeret	DC798D
------------------------------	--------

2) B-diagnose -primær sygdom (en af nedenstående)

Livmoderhalskræft	DC539
-------------------	-------

3) Tillægskode til B-diagnose

Metastase status (minimum 1 af nedenstående)

Recidiv	ZDW51F
Intet lokalrecidiv påvist (hvis relevant)	DZ063A
Ingen lymfeknudemetastaser påvist (hvis relevant)	DZ062A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel

A-diagnose: Fjernmetastase specificeret

DC798D

B-diagnose: Livmoderhalskræft

DC539

Tillægskode

>Recidiv

ZDW51F

>Intet lokalrecidiv påvist (hvis relevant)

DZ063A

>Ingen lymfeknudemetastaser påvist (hvis relevant)

DZ062A

Canceranmeldelse: Klinisk recidiv

AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

OPERATION

Laparoskopisk (robotassisteret) operation

Kodevejledningen er opbygget over følgende koder for

1) **Primær procedurekoder** (hysterektomi er primær kode)

2) **Tillægskode**

a. **Operationstype**

b. **Anvendelse af robot** (skal tilføjes alle procedurekoder)

3) Øvrige procedureskoder

Procedurekoder

UTERUS (primær koden)	
Total laparoskopisk hysterektomi m. laparoskopisk suturering af vaginaltoppen	KLCD01A
Radikal laparoskopisk hysterektomi	KLCD31
CERVIX (primær kode ved fertilitetsbevarende indgreb)	
Laparoskopisk trakelektomi	KLDC21
ADNEXAE	
Laparoskopisk enkeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF01
Laparoskopisk dobbeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF11
Laparoskopisk enkeltsidig salpingektomi	KLBE01
Laparoskopisk dobbeltsidig salpingektomi	KLBE11
LYMFEKNUDER	
Laparoskopisk excision af iliakal lymfeknude (bulky nodes)	KPJD64
Laparoskopisk excision af iliakal sentinel node	KPJD64A
Laparoskopisk radikal excision af iliakale lymfeknuder	KPJD74
Laparoskopisk excision af para-aortal lymfeknuder (bulky nodes)	KPJD63
Laparoskopisk excision af para-aortal sentinel node	KPJD63A
Laparoskopisk radikal excision af para-aortale lymfeknuder	KPJD73

1) Tillægskoder

a) Operationstype

Primær operation	KZYD01
Intervalkirurgi	KZYD02
Primær operation efter forudgående diagnostisk indgreb, men erkendes inoperabel	KZYD03
Recidiv kirurgi	KZYD04
Staging kirurgi	KZYN03

b) Anvendelse af robot ved laparoskopisk indgreb (tilføjes alle procedurekoder)

Anvendelse af robot	KZXX00
---------------------	--------

Åben operation

Kodevejledningen er opbygget over følgende koder for

- 1) Primære procedurekode (hysterektomi)
- 2) Tillægskode
 - a. Operationstype
- 3) Øvrige procedurekoder

Procedurekoder

UTERUS primær kode	
Total hysterektomi	KLCD00
Vaginal hysterektomi	KLCD10
Radikal hysterektomi	KLCD30
CERVIX (primær kode ved fertilitetsbevarende indgreb)	
Trakelektomi	KLCD20
Konisation af livmoderhals	KLDC00
Konisation af livmoderhals med diatermi eller laser	KLDC03
Resektion af livmoderhals	KLDC10
ADNEXAE	
Enkeltsidig salpingektomi	KLBE00
Dobbeltsidig salpingektomi	KLBE03
Enkeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF00
Dobbeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF10
LYMFEKNUDER	
Excision af para-aortale lymfeknuder (kun fjernelse af bulky nodes)	KPJD43
Excision af iliacale lymfeknuder (kun fjernelse af bulky nodes)	KPJD44
Radikal excision af para-aortale lymfeknuder (systematisk lymfadenektomi)	KPJD53
Radikal excision af iliacale lymfeknuder (systematisk lymfadenektomi)	KPJD54
Excision af iliakal sentinel node	KPJD44A
Excision af para-aortal sentinel node	KPJD43A
Excision sentinel node anden lokalisation	KPJD99

Tillægskoder**a) Operationstype**

Primær operation	KZYD01
Intervalkirurgi	KZYD02
Primær operation efter forudgående diagnostisk indgreb, men erkendes inoperabel	KZYD03
Kirurgi ved recidiv	KZYR30
Staging kirurgi	KZYN03

Procedurer i forbindelse med stadieinddeling

Dilatation af livmoderhals	KLDA00
Resektion af livmoderhals	KLDC10
Konisation af livmoderhals	KLDC00
Konisation af livmoderhals med diatermi eller laser	KLDC03
Udskrabning af livmoderhals	KLDA10
Biopsi af livmoderhals	KLDA20
Biopsi af vagina	KLEB00
Biopsi af vulva og perineum	KLFB00
UL-undersøgelse af genitalia feminina	UXUD80
Transvaginal UL-undersøgelse af genitalia feminina	UXUD82
Gynækologisk undersøgelse i universel anæstesi	ZZ4195
+ Anden mindre gynækologisk procedure	KTLW99
Anden rektoskopisk operation på endetarm	KJGW98
Cystoskopi med biopsi	KUKC05
Cystoskopi	KUKC02

Behandling af cervix cancer med åben radikal hysterektomi, salpingektomi og bilateral sentinel node

EKSEMPEL

Primær procedurekode: Radikal hysterektomi

KLCD30

Tillægskode: Primær operation

KZYD01

Øvrige procedurekoder:

Dobbeltsidig salpingektomi KLBE03

Excision af iliakal sentinel node

KPJD44A

Tillægskode Dobbeltsidig

TUL3